

2025 年 3 月 17 日 頭部打撲について

こんにちは。もりもりキッズ・アレルギークリニックです。

ソファやベッドから落ちて頭を打った。遊んでいてコンクリートに頭を打った。そんな経験があり、受診すべきかどうか悩んだことはありませんか？

①いつも通り元気になっている。ぶつけてもすぐ泣いて泣き止んだ。食欲がある。場合は自宅で様子を見ても良いでしょう。

②次のような場合は注意が必要です。

- ・ 1 歳以下で 90 cm 以上、2 歳以上で 150 cm 以上に高さから落ちた
- ・ 意識消失がある ・ 嘔吐を繰り返す
- ・ 傾眠傾向がある
- ・ 後頭部や頭頂部、側頭部に皮下出血がある

③上記に当てはまらない場合も、少し時間が経ってから頭の中にできた血の固まりが大きくなり、脳を圧迫することがあるので以下のような症状が出た時には病院を受診してください。

- ・ 痙攣する ・ 普段と違う
- ・ 赤ちゃんがミルクの時間になっても起きない
- ・ 顔色が悪い、機嫌が非常に悪い
- ・ 手足や体の動きが悪い
- ・ 頭や首の痛みが悪化した
- ・ 嘔吐を繰り返す